



# MASTICURE PLUS

## ANTIBIÓTICO INTRAMAMARIO



### TRATAMIENTO

de **MASTITIS CLÍNICAS**  
durante el **PERÍODO DE LACTANCIA**

productos elaborados en **Uruguay**

[www.laboratorioscherryvenezuela.com](http://www.laboratorioscherryvenezuela.com)

# MASTICURE PLUS

Antibiótico con antiinflamatorio y Vitamina D3 para aplicar por vía intramamaria, para uso en el periodo de lactancia.

## COMPOSICIÓN: Cada inyector de 10 ml contiene:

Espiramicina Adipato	300 mg.
Gentamicina	200 mg.
Flumetasona	2,5 mg.
Vitamina D3	0,1 mg.
Excipientes c.s.p.	1 inyector.

## » INDICACIONES

- Antibiótico-antiinflamatorio de aplicación intramamaria.
- Para uso en el periodo de lactancia.
- Tratamiento de mastitis producidas por microorganismos sensibles a la **Espiramicina** o **Gentamicina**, durante la lactancia en bovinos.
- Con un nuevo concepto de inmunoestimulación local por el aporte vitamínico de la Vit. D3.



**ANTIBIÓTICO a base de:**  
**ESPIRAMICINA + GENTAMICINA**  
**FLUMETASONA + VITAMINA D3**



**Indicaciones:** En tratamientos de Mastitis Clínicas, producidas por bacterias sensibles a los principios activos presentes en el producto, en vacas en el periodo de lactancia.



DESTINADO  
A BOVINOS



## » Mecanismo de acción

- **FLUMETASONA:** Corticoide antiinflamatorio que reduce rápidamente la inflamación y facilita la penetración y acción de los antibióticos.
- **ESPIRAMICINA:** Gran actividad frente Gram + (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Actinobacillus spp.*, etc.) Gram -, y *mycoplasmas*.
- **GENTAMICINA:** Buena actividad sobre gérmenes Gram - (como *E. coli.*, y otros: *Enterobacter aerogenes*, *Salmonella spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Klebsiella spp.*, *Serratia* y especies de *Staphylococcus coagulasa + y -*.  
**\*\*\*Superior que la Neomicina contra Gram Negativo\*\*\***



 POMO  
INTRAMAMARIO

**Antibiótico de Aplicación  
INTRAMAMARIA**

**Indicado en el  
PERÍODO DE LACTANCIA**



**Contraindicaciones:** Conservar en lugar seco y fresco, lejos de la luz solar, manteniendo la temperatura entre 15 °C y 30 °C.

Almacenar lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

Descartar envases y sobrantes, de acuerdo a la normativa vigente de cada país, para productos veterinarios.



## » ¿Cómo usarlo?

- Diagnóstico de Mastitis Clínica.
- Ideal Cultivo y Antibiograma.
- Ordeñar a fondo.
- Desinfectar la punta del pezón.
- Administrar por vía intra mamaria, repetir cada 12 a 24 horas por mínimo dos días (a juicio del facultativo).
- Colocar el Sellador.

## » Dosis y Administración:

- Aplicar una jeringa o 10 ml por cuarto mamario.
- Intervalo entre dosis: cada 12 o 24 horas.
- Duración del tratamiento: mínimo de 2 días o según criterio del Veterinario actuante.

### ▮ Período de Carencia:



**Carne: 8 días.**



**Leche: 4 días.**

### ▮ Restricciones:



**Pre - Ordeño = 96 horas.**



## Dosificación:

**Un inyector (10 g) por cuarto mamario.**



**8 INYECTORES x  
CAJA de PRODUCTO**

**PRESENTACIÓN:**

**JERINGA de 1 DOSIS de 10 gr**



Importado por:

 **suply equinos**

RIF: J-29522498-2

 info.suplyequinos@gmail.com  
 info.labcherryvzla@gmail.com

SÍGUENOS:

 **labcherryvzla**  
**suplyequinos**

[www.suplyequinos.com](http://www.suplyequinos.com)



**ESCANEA EL CÓDIGO QR**  
y visualiza los catálogos de productos

[www.laboratorioscherryvenezuela.com](http://www.laboratorioscherryvenezuela.com)

Productos Fabricados en Planta Certificada



productos elaborados en **Uruguay**