



catálogo de productos
**GRANDES
ANIMALES**
elaborados en Uruguay

LABORATORIOS Cherry

DIVISIÓN VETERINARIA

MEDICINA ANIMAL DE CALIDAD



Productos Fabricados en Planta Certificada



www.laboratorioscherryvenezuela.com

ÍNDICE GENERAL

ANTIBIÓTICOS

INYECTABLES

ESTREPEN L.A.	4	ESPIRAMICINA CHERRY	9
OXITETRACICLINA L.A. 20% CHERRY	5	OXIMAX 30% FM	10
OXITETRACICLINA 5% CHERRY	6	GENTACHERRY 10%	11
CURCID 5%	7	FLOCHERRY 30%	12
CEFACHERRY	8	TILCHERRY PLUS	13

ANTIBIÓTICOS

INTRAMAMARIOS

MASTICURE PLUS	15
RIFACHERRY S	16

ANTIPARASITARIOS

INYECTABLES

SIPCAR i + AD3E	18
SIPCAR i 3,15% + AD3E	19
DORACHERRY + AD3E	20
MAXIMUS Z	21
RAFOXAN	22
ENDECTO PLUS	23

ANTIPARASITARIOS

ORALES

TRICLACHERRY PLUS	25
FENZOLE 10% ORAL	26
SIPCAR PLUS Pasta Oral	27
EQUIMAX T	28

ARETES

INSECTICIDAS

POWER FLY OUT	30
----------------------------	----

ECTOPARASITICIDAS

POUR ON

CHERRYON TAMBO	32
FIPROCHERRY POUR ON	33
MAXIMUS PLATINUM	34

ECTOPARASITICIDA

BAÑO POR ASPERSIÓN

TICKGARD PLUS	36
----------------------------	----

MATAGUSANOS

SPRAY - POMADA

CURABICHERRY PLATA	38
CURABICHERRY VIOLETA	39
CURABICHERRY POMADA	40

SUPLEMENTOS Y RECONSTITUYENTES


INYECTABLES

FORTEMAX SUERO	42
GANEKILOS B12	43
GANEMAX ATP	44

SUPLEMENTO

ORAL

HEPATOCERRY 1 LITRO	46
----------------------------------	----



ANTIBIÓTICOS

INYECTABLES


ESTREPEN L.A.
OXITETRACICLINA L.A. 20% CHERRY
OXITETRACICLINA 5% CHERRY
CURCID 5%
CEFACHERRY

ESPIRAMICINA CHERRY
OXIMAX 30% FM
GENTACHERRY 10%
FLOCHERRY 30%
TILCHERRY PLUS

ANTIBIÓTICOS

INYECTABLES

ESTREPEN L.A.

**Composición:** Cada 100 ml contiene:

Penicilina G procaínica	11,3 g.
Penicilina G benzatínica	9,2 g.
Sulfato de Dihidroestreptomicina	20,0 g.
Procaína clorhidrato	0,5 g.

Indicaciones: Para el control y tratamiento de infecciones bacterianas en el sistema respiratorio, tracto urinario, gastrointestinal, reproductivo, glándula mamaria, piel, etc.

En neumonías bacterianas, carbunco sintomático, actinomicosis, necrobacilosis, leptospirosis, clostridiosis, adenitis equina, síndrome metritis mastitis agalactia, dermatitis estafilocócica o cualquier infección provocada por microorganismos sensibles a la penicilina y dihidroestreptomicina.

Período de carencia:

Carne: No enviar a faena para consumo humano a los animales tratados, hasta pasados 60 días del último tratamiento.

Leche: No administrar en animales en lactación cuya leche se destine a consumo humano.

No administrar a animales hipersensibles a los principios activos ni en animales con menos de 1 mes de vida.

No administrar en hembras gestantes.

No es recomendable administrar en caso de falla renal o hepática.

Presentación: 50 ml, 100 ml.

**Especies animales a las que se destina:**

Bovinos, Ovinos, Equinos, Porcinos, Caninos, Felinos.

Vía de administración:

Inyectable intramuscular, aplicando las medidas de asepsia correspondientes a la administración de inyectables.

Agitar bien antes de usar.

Dosis:

Cada ml contiene:

- 100.000 UI de Penicilina G procaínica.
- 100.000 UI de Penicilina G benzatínica.
- 159,8 mg de Dihidroestreptomicina base.

Dosis recomendada:

1 ml cada 10 - 20 kg de peso vivo.


No se recomienda su uso en caninos y felinos con peso menor a 10 kg.

Repetir si fuera necesario la dosis cada 72 horas, tratar hasta 48 - 72 horas después de desaparecidos los signos clínicos.

ANTIBIÓTICOS

INYECTABLES

OXITETRACICLINA L.A. 20% CHERRY



Composición: Cada 100 ml contiene:
Oxitetraciclina (clorhidrato) 20 g.
Excipientes c.s.p. 100 ml.

Indicaciones: Antibiótico bacteriostático de amplio espectro. Para promover una acción prolongada y sostenida en el control y tratamiento de cuadros infecciosos causados por gérmenes Gram positivos, Gram negativos (tanto aerobios como anaerobios), *Mycoplasmataceae*, *Rickettsiae*, *Chlamydiaceae*, ciertos hongos patógenos o protozoarios.

Período de carencia:

Carne: 30 días.

No administrar a hembras en producción láctea cuya leche se destine para consumo humano.

No administrar a ponedoras en producción de huevos destinados a consumo humano.

Presentación: 100 ml, 250 ml.



**Especies animales
a las que se destina:**

Bovinos, Ovinos,
Porcinos y Aves.

Vía de administración:

Parenteral, por inyección intramuscular profunda, con los cuidados de asepsia correspondientes a un inyectable; puede administrarse por vía subcutánea e intravenosa bajo la indicación del Médico Veterinario tratante acorde a la especie a dosificar.

Dosis:

20 mg / kg p.v.
cada 2 a 4 días.

Bovinos, Ovinos y Porcinos:

1 ml cada 10 kg p.v.
equivalente a 200 mcg de
Clorhidrato de Oxitetraciclina.

Aves de engorde:

0,15 - 0,30 ml / kg p.v.

ANTIBIÓTICOS

INYECTABLES

OXITETRACICLINA 5% CHERRY



Composición: Cada 100 ml contiene:
Oxitetraciclina (clorhidrato) 5 g.
Excipientes c.s.p. 100 ml.

Indicaciones: Antibiótico bacteriostático de amplio espectro. Para control y tratamiento de cuadros infecciosos causados por gérmenes Gram positivas, Gram negativas (tanto aerobias como anaerobias), *Mycoplasmataceae*, *Rickettsiae*, *Chlamydiaceae*, ciertos hongos patógenos o protozoarios.

Período de carencia:

Carne: 18 días.

No administrar a hembras en producción láctea cuya leche se destine para consumo humano.

Presentación: 100 ml, 500 ml.



**Especies animales
a las que se destina:**

Bovinos, Ovinos,
Caprinos, Porcinos,
Equinos, Caninos y Felinos.

Vía de administración:

Parenteral, por inyección intramuscular profunda, con los cuidados de asepsia correspondientes a un inyectable; puede administrarse por vía subcutánea e intravenosa bajo la indicación del Profesional actuante acorde a la especie a dosificar.

Dosis:

**Todas las especies
mencionadas:**

2 - 10 mg / kg p.v. por día.

Grandes animales:

8 - 20 ml cada 100 kg p.v.
por día.

Pequeños animales:

0,8 - 2 ml cada 10 kg p.v.
por día.

ANTIBIÓTICOS

INYECTABLES

CURCID 5%



Composición:

Enrofloxacin 5 g.
Excipientes c.s.p. 100 ml.

Indicaciones: Para el tratamiento y profilaxis de infecciones dérmicas, respiratorias, urinarias y gastrointestinales causadas por gérmenes Gram (+), Gram (-) y *Mycoplasmataceae*.

Período de carencia:

Una vez tratados los animales, no enviarlos a faena hasta pasados 7 días del último tratamiento.

No administrar a hembras en producción láctea cuya leche se destine para consumo humano.

Contraindicaciones: Se recomienda precaución al administrar en animales que se encuentren en etapa de desarrollo o crecimiento, o con lesión renal.

No realizar en estos tratamientos prolongados.

Puede ser utilizado en perras gestantes.

Presentación: 100 ml.



Especies animales a las que se destina:

Bovinos,
Porcinos,
y Caninos.

Vía de administración:

Bovinos y Caninos:

Vía inyección subcutánea, intramuscular e intravenosa.

Porcinos:

Vía inyección intramuscular.

Dosis:

Bovinos y Porcinos:

0,5 ml por cada 10 kg de peso vivo durante 3 días como dosis básica.

1 ml por cada 10 kg de peso vivo durante 3 días en infecciones respiratorias complicadas.

1 ml por cada 10 kg de peso vivo durante 5 días en Salmonelosis.


Caninos:

0,5 ml por cada 5 kg de peso vivo durante 5 días. En casos severos o crónicos prolongar por 10 días.

ANTIBIÓTICOS

INYECTABLES

CEFACHERRY



Composición: Cada 100 ml contiene:
Ceftiofur clorhidrato 5,35 g (*).
Excipientes c.s.p. 100 ml.
(*). Equivalentes a 5 g de Ceftiofur base.

Indicaciones: Antibiótico de amplio espectro (Cefalosporina de Nueva Generación), para el tratamiento y control de enfermedades producidas por gérmenes Gram (+) y Gram (-) incluyendo cepas de bacterias productoras de betalactamasa, de bovinos y porcinos.

Período de carencia:

Carne:

Bovinos: 2 días.

Porcinos: 4 días.

Leche: 0 días.

Presentación: 100 ml.



**Especies animales
a las que se destina:**
Bovinos y Porcinos.

Vía de administración:
Intramuscular o subcutánea
en bovinos; en porcinos
intramuscular profunda
únicamente.

Dosis:

Bovinos:

1,1 a 2,2 mg por kg
de peso vivo,
(1 a 2 ml / 50 kg de peso)
cada 24 hrs. durante
3 a 5 días consecutivos.

Porcinos:

3 a 5 mg. por kg
de peso vivo,
(3 a 5 ml / 50 kg de peso)
cada 24 hrs. durante
3 a 5 días consecutivos.

ANTIBIÓTICOS

INYECTABLES

ESPIRAMICINA CHERRY



Composición: Cada 100 ml contiene:
Espiramicina adipato 17,13 g (*).
Excipientes c.s.p. 100 ml.
(*) corresponde a 60.000.000 U.I.

Indicaciones: Está indicada para la prevención y tratamiento de cuadros infecciosos provocados por gérmenes Gram positivos, Gram negativos, Micoplasmas, ciertas Coccidias y Rickettsias.

Período de carencia:

Carne: 21 días.

Leche: 180 horas.

Aves y Huevos: 5 días.

Presentación: 100 ml.



**Especies animales
a las que se destina:**

Bovinos, Ovinos,
Caprinos, Porcinos,
Aves, Caninos y Felinos.

Vía de administración:

Parenteral, intramuscular
profunda.

Dosis:

Bovinos:

Adultos: 1 ml cada 20 kg
de peso vivo.

Terneros: 1 ml cada 10 kg
de peso vivo.

Ovinos y Caprinos:

1 ml cada 8 kg de peso vivo.

Porcinos:

Lechones: 4 a 5 ml.

Adultos y reproductores:

15 a 25 ml.

Caninos y Felinos:

0,5 ml cada 4 kg de peso vivo

Aves:

0,5 / 1 ml por cada kg
de peso vivo.

ANTIBIÓTICOS

INYECTABLES

OXIMAX 30% FM

FM con
EFECTO
ANTIENDOTÓXICO
por
24 a 36
HORAS



Composición: Cada 100 ml contiene:

Oxitetraciclina dihidrato (*) 32,4 g.

Flunixin meglumina (**) 3,3 g.

Excipientes c.s.p. 100 ml.

(*) equivalente a 30 g de Oxitetraciclina.

(**) equivalente a 2 g de Flunixin base.

Indicaciones: Acción complementaria de un antibiótico de amplio espectro de larga acción (OXITETRACICLINA L.A.) y un antiinflamatorio no esteroideo (FLUNIXINA), analgésico y antipirético con efecto antiendotóxico por 24 a 36 hrs., para optimizar el tratamiento en una sola aplicación.

Oxitetraciclina: Promueve acción prolongada y sostenida en el control y tratamiento de cuadros infecciosos del sistema respiratorio, urinario e infecciones locales causadas por gérmenes Gram +, Gram -.

Flunixin: Infecciones donde un efecto antiinflamatorio, antipirético y antiendotóxico es requerido. Tratamiento de inflamación del aparato locomotor y musculoesquelético. En cuadros inflamatorios asociados al "Complejo Respiratorio Bovino" por su acción antipirética. Diarreas neonatales, "vaca caída" y tratamiento de mastitis agudas.

Período de carencia:

No administrar a hembras en producción láctea cuya leche se destine para consumo humano.

No enviar los animales a faena cuya carne se destine para consumo humano hasta transcurridos:

- Dosis de 20 mg / kg p.v. = Hasta transcurridos 28 días del último tratamiento.
- Dosis de 30 mg / kg p.v. = Hasta transcurridos 35 días del último tratamiento.

Presentación: 100 ml, 250 ml.



**Especies animales
a las que se destina:**
Bovinos.

Vía de administración:

Se administra por vía parenteral, intramuscular profunda, preferentemente en la región del cuello (tabla del cuello).

No administrar más de 10 ml por punto de inoculación.

Dosis:

Posología sugerida:

10 ml cada 100 kg p.v.
(equivalentes a 30 mg / kg de p.v. de Oxitetraciclina y a 2 mg / kg de p.v. de Flunixin).

Dosis:

10 ml cada 150 kg p.v.
para infecciones leves;

10 ml cada 100 kg p.v.
para infecciones moderadas a severas.

El intervalo puede variar acorde a las necesidades de cada caso y/o a criterio del Profesional actuante.

ANTIBIÓTICOS

INYECTABLES

GENTACHERRY 10%



Composición: Cada 100 ml contiene:
Gentamicina base 10 g.
Excipientes c.s.p. 100 ml.

Indicaciones: Para el control y tratamiento de infecciones bacterianas causadas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos (principalmente Gram negativos aerobios), con localización en aparato respiratorio, tracto urinario, gastrointestinal, reproductivo, glándula mamaria, piel, etc.

Período de carencia:

Carne:

Bovinos, Ovinos y Porcinos: 40 días.

Pollos: 36 días.

Leche: 72 horas.

Cuando la leche se destine a consumo humano no utilizarla hasta pasadas 72 horas del último tratamiento.

Contraindicaciones: En caso de hipersensibilidad a la gentamicina.

Utilizar con precaución en casos de enfermedad renal o trastornos neuromusculares preexistentes.

Presentación: 50 ml, 100 ml.



**Especies animales
a las que se destina:**

Bovinos, Ovinos, Equinos,
Cerdos, Caninos, Felinos,
Aves y Pequeños Roedores.

Vía de administración:

Intramuscular.

Dosis:

La dosis recomendada es de 0,3 - 0,6 ml cada / 10 kg de peso en todas las especies, una vez al día o cada 12 horas, según criterio del Profesional actuante (equivale a 3 - 6 mg / kg, de Gentamicina).

ANTIBIÓTICOS

INYECTABLES

FLOCHERRY 30%

**Composición:** Cada 100 ml contiene:

Florfenicol 30 g.
Excipientes c.s.p. 100 ml.

Indicaciones: Antibiótico bacteriostático, derivado fluorinado de los nitrobenzenos (Cloramfenicol y Tiamfenicol), pero de mayor espectro de acción y seguridad (no posee efectos colaterales nocivos y/o indeseables). Actúa contra infecciones producidas por gérmenes Gram + y Gram - y algunos gérmenes anaerobios; infecciones en general causadas por gérmenes sensibles al Florfenicol.
Tratamiento de enfermedades respiratorias: neumonía bacteriana, (incluyendo enfermedad del complejo respiratoria bovina o fiebre del embarque); diarrea de los terneros; querato-conjuntivitis; pododermatitis infecciosa, flemón interdigital, necrobacilosis interdigital aguda; infecciones del tracto genital, endometritis; prostatitis; artritis; entre otros, infecciones en general.

Período de carencia:

Carne Ganado: I.M. = 28, S.C. = 38;
en ambos casos luego de la última aplicación.

Carne Porcinos: 28 días después de la última aplicación (sitio de inyección: 21 días).

No administrar a:

- Animales en lactación cuya leche se destine al consumo humano.
- Hembras lecheras mayores de 20 meses de edad.
- Terneros menores a 1 año de edad.

Presentación: 100 ml.



Especies animales a las que se destina:
Bovinos y Porcinos.

Vía de administración:

Parenteral, inyectable por vía intramuscular o subcutánea preferentemente, en la región de la nuca o tabla del cuello únicamente.

Dosis:

Ganado: Bovinos: 10 ml cada 150 kg de peso vía I.M., repetir a las 48 hrs. como preventivo o en animales de alto riesgo de desarrollar "complejo de enfermedad respiratoria bovina" o con neumonía, administrar dosis única, vía S.C. de 10 ml / 75 kg de peso.

Porcinos: 1 ml / 20 Kg o 1 ml / 30 kg de peso, en caso de neumonías repetir a las 48 hrs. o hasta la remisión de los síntomas con un intervalo entre aplicaciones de 48 hrs.

No administrar más de 10 ml por punto de inoculación.

Si pasados 3 días de la primera inoculación no se obtiene mejoría en los animales, se recomienda reevaluar el diagnóstico.

ANTIBIÓTICOS

INYECTABLES

TILCHERRY PLUS

**Composición:** Cada 100 ml contiene:

Tilmicosina (como Tilmicosina fosfato)	30,0 g.
Flunixinina (como Flunixinina meglumina)	3,7 g.
Excipientes c.s.p.	100 ml.

Indicaciones: Está indicado para el tratamiento de las enfermedades respiratorias de los bovinos (ERB), especialmente las asociadas con *Pasteurella haemolytica* y *multocida* y otros microorganismos sensibles a la Tilmicosina. Queratoconjuntivitis infecciosa bovina, asociada a cepas susceptibles a Tilmicosina, de *Moraxella bovis*. Pododermatitis necrótica (Pietín) asociada con *Fusobacterium necrophorum*, *Bacteroides nodosus* y *Melaninogenicus*, *Porphyromonas Asaccharolytica* y *Prevotella intermedia*. Producto indicado cuando además de la acción antibiótica se necesita la acción de un antiinflamatorio, analgésico y antipirético potente.

Vía de administración:

Administración parenteral, subcutánea únicamente aplicando las medidas de asepsia correspondientes a la administración de inyectables.

Se recomienda su administración bajo orientación Veterinaria.

No aplicar más de 10 ml por punto de inoculación.

Período de carencia:

Carne: 28 días.

Leche: No administrar en animales en etapas de producción lechera cuya leche se destine a consumo humano.

Presentación: 100 ml.

**Especies animales a las que se destina:**

Solución inyectable, antibiótico, analgésico y antiinflamatorio de uso exclusivo en Bovinos.

Dosis:

Cada ml del producto contiene 300 mg de Tilmicosina y 37 mg de Flunixinina meglumina.

Dosis recomendada:

• **Neumonía:** 10 mg de Tilmicosina / kg, equivalente a 1 ml cada 30 kg de peso.

• **Queratoconjuntivitis, Pietín y otros cuadros infecciosos:**

de 5 a 10 mg de Tilmicosina / kg equivalente a 1 ml cada 30 a 60 kg de peso, según la gravedad del caso y criterio del Médico Veterinario.

Se recomienda una sola dosis, en caso que el profesional actuante decida repetirla, el intervalo recomendado es de 72 horas.



ANTIBIÓTICOS

INTRAMAMARIOS

MASTICURE PLUS
RIFACHERRY S

ANTIBIÓTICOS

INTRAMAMARIOS

MASTICURE PLUS

TRATAMIENTO
de MASTITIS CLÍNICAS
durante el PERÍODO DE LACTANCIA



Composición: Cada inyector de 10 ml contiene:

Espiramicina Adipato	300 mg.
Gentamicina	200 mg.
Flumetasona	2,5 mg.
Vitamina D3	0,1 mg.
Excipientes c.s.p.	1 inyector.

Indicaciones: En tratamientos de mastitis clínicas, producidas por bacterias sensibles a los principios activos presentes en el producto, en vacas en el periodo de lactancia.

Período de carencia:

Carne: 8 días.

Leche: 4 días.

Contraindicaciones: Conservar en local seco y fresco, lejos de la luz solar, manteniendo la temperatura entre 15 °C y 30 °C.

Almacenar lejos del alcance de los niños y animales domésticos.

Descartar envases y sobrantes, de acuerdo a la normativa vigente de cada país, para productos veterinarios.

Presentación: Pomos de 10 g cada uno.



**Especies animales
a las que se destina:**
Bovinos.

Vía de administración:
Vía intramamaria en vacas lecheras durante el periodo de lactancia.

Dosis:
Aplicar una jeringa o 10 ml por cuarto mamario.

Intervalo entre Dosis:
Cada 12 o 24 horas.

ANTIBIÓTICOS

INTRAMAMARIOS

RIFACHERRY S

TRATAMIENTO

de MASTITIS SUB-CLÍNICAS
durante el PERÍODO DE SECADO



Composición: Cada inyector con 5 g contiene:
Rifaximina 100 mg.
Excipientes c.s.p. 1 inyector.

Indicaciones: Para el tratamiento de mastitis subclínicas durante el período de secado.
Eficaz acción contra microorganismos Gram + y Gram -, como preventivo de procesos infecciosos durante el período de secado y de mastitis aguda postparto.

Período de carencia:

Carne: 0 días.

Leche: 0 días.

Contraindicaciones: No administrar en animales con hipersensibilidad conocida al principio activo.

Aplicar solo después del último ordeño previo al secado.

No administrar en animales durante el periodo de lactación.

Presentación: Pomos de 5 g cada uno.



**Especies animales
a las que se destina:**
Bovinos.

Vía de administración:
Vía intramamaria.

Después de ordeñar completamente la ubre inmediatamente previo al secado, sumergir los pezones en desinfectante y secar en forma individual.

A través del conducto del pezón, infundir el contenido de la jeringa, masajeando hacia arriba para favorecer la difusión del producto.

Se recomienda el uso de este producto después del diagnóstico bacteriológico y test de sensibilidad del microorganismo causante o en base a las características epidemiológicas de la unidad de producción lechera.

Dosis:

Un inyector (5 g) por cuarto mamario.



ANTIPARASITARIOS

INYECTABLES

SIPCAR i + AD3E
SIPCAR i 3,15% + AD3E
DORACHERRY + AD3E

MAXIMUS Z
RAFOXAN
ENDECTO PLUS

ANTIPARASITARIOS

INYECTABLES

SIPCAR i + AD3E

**Composición:** Cada 100 ml contiene:

Ivermectina	1.1 g.
Vitamina A palmitato	5.000.000 U.I.
Vitamina E acetato	1.000 U.I.
Vitamina D3	40.000 U.I.
Excipientes c.s.p.	100 ml.

Indicaciones: Endectocida inyectable con vitaminas.

La asociación de Ivermectina con vitaminas A, D3, E ayuda al mantenimiento basal y funcional del organismo animal, incorporando elementos necesarios para ello, que generalmente son desbalanceados por el daño parasitario.

Período de carencia:

Carne: 35 días.

Contraindicaciones:

No administrar en hembras en período de lactación.
No administrar 28 días antes del parto.

Presentación: 100 ml, 500 ml.

**Especies animales
a las que se destina:**

Bovinos, Ovinos, Caprinos,
Porcinos y Equinos.

Vía de administración:

Por inyección subcutánea
en zonas de piel laxa.

Dosis:**Bovinos, Ovinos,
Caprinos y Equinos:**

- 1 ml cada 50 kg de peso vivo (equivalente a 220 mcg de Ivermectina, 1000 U.I. de Vitamina A palmitato, 8 U.I. de Vitamina D3 y 0,2 U.I. de Vitamina E acetato por kg de peso vivo).

Porcinos:

- 1 ml cada 33 kg de peso vivo (equivalente a 300 mcg / kg de p.v.).

ANTIPARASITARIOS

INYECTABLES

SIPCAR i 3,15% + AD3E

**Composición:** Cada 100 ml contiene:

Ivermectina	3,15 g.
Vitamina A palmitato	2,75 g (5.000.000 UI).
Vitamina D3 cristalina	0,0125 g (500.000 UI).
Vitamina E acetato	1,0 g (1.000 UI).
Excipientes c.s.p.	100,00 ml.

Indicaciones: Tratamiento, control y profilaxis de infecciones por parásitos gastrointestinales y pulmonares, así como también para las ectoparasitosis por piojos, sarnas, bernés y garrapatas.

El producto posee un mecanismo de absorción lenta y de eficacia prolongada, que elimina los parásitos indicados y previene nuevas infecciones por largos períodos (efecto profiláctico).

Período de carencia:

El período de carencia en la carne para consumo es de 122 días.

Contraindicaciones: No se aconseja utilizar el producto en bovinos de leche en producción.

En caso de aplicarse en hembras lecheras, se recomienda hacer la última aplicación 122 días antes del parto.

Presentación: 500 ml.



**Especies animales
a las que se destina:**
Bovinos.

Vía de administración:
Subcutánea.

Dosis:

Agitar bien durante un minuto antes de dosificar, manteniendo cierta periodicidad de agitación en el transcurso de las dosificaciones.
Administrar 1 ml cada 50 kg de peso vivo, por vía subcutánea, equivalente a una dosis de 630 mcg. de Ivermectina; 1000 UI de Vit. A; 100 UI de Vit. D3 y 0,2 UI de Vit. E. por kg de peso vivo.

Intervalo entre Dosis:

Entre 5 y 7 semanas contra nematodos gastrointestinales y pulmonares.
Entre 45 días contra garrapatas y más de 100 bernés.
Una sola aplicación es suficiente para combatir infecciones de sarna Psoróptica; y si fuera necesario repetir a criterio del Profesional actuante.

ANTIPARASITARIOS

INYECTABLES

DORACHERRY + AD3E



Composición: Cada 100 ml de concentrado contiene:

Doramectina	1,00 g.
Vitamina A palmitato	2,75 g.
Vitamina E acetato	5,00 g.
Vitamina D3 cristalina	12,50 mg.
Excipientes c.s.p.	100,00 ml.

Indicaciones: Antiparasitario de amplio espectro contra endo y ectoparásitos (endectocida) con vitaminas A, D3 y E.

Período de carencia:

Carne:

Bovinos y Ovinos: 49 días.

Porcinos: 28 días.

Contraindicaciones: No administrar en hembras en producción láctea, cuya leche se destine para consumo humano o industrialización.

Presentación: 500 ml.



Especies animales a las que se destina:
Bovinos, Ovinos y Porcinos.

Vía de administración:

Bovinos y Ovinos:

Por inyección subcutánea preferentemente en zona de piel laxa o intramuscular en la región de la nuca.

Porcinos:

Por inyección intramuscular exclusivamente.

Dosis:

Bovinos y Ovinos:

1 ml cada 50 kg de peso vivo (equivalente a 200 mcg por kg de peso de Doramectina; 1000 U.I. de Vitamina A palmitato, 100 U.I. de Vitamina D3 cristalina y 1 U.I. de Vitamina E acetato por kg de peso vivo).

Porcinos:

1 ml cada 33 kg de peso vivo (equivalente a 300 mcg de Doramectina; 1515 U.I. de Vitamina A palmitato, 151 U.I. de Vitamina D3 cristalina y 1,5 U.I. de Vitamina E acetato por kg de peso vivo).

ANTIPARASITARIOS

INYECTABLES

MAXIMUS Z

FLUAZURÓN 12,5% + IVERMECTINA 3,15%

EFFECTO TUMBADOR Y PODER RESIDUAL



Composición: Cada 100 ml contiene:

Fluazurón 12.5 g.

Ivermectina 3,15 g.

Excipientes c.s.p. 100 ml.

Indicaciones: Para el tratamiento y control de parásitos internos y externos de los bovinos: nematodos, bernes, piojos, sarna y garrapatas.

Rápida acción de volteo y poder residual.

Período de carencia:

Carne: 130 días.

No administrar en vacas en lactación cuya leche se destine a consumo humano.

Presentación: 500 ml.



**Especies animales
a las que se destina:**
Bovinos.

Vía de administración:

Vía subcutánea, por detrás de la paleta, tomando las medidas de asepsia indicadas para la aplicación de inyectables.

Dosis:

1 ml cada 50 kg de peso equivalente a 630 mcg. de Ivermectina por kg de peso vivo y 2,5 mg de Fluazurón / kg de peso vivo.

ANTIPARASITARIOS

INYECTABLES

RAFOXAN



Composición: Cada 100 ml contiene:
Rafoxanida 7,5 g.
Excipientes c.s.p. 100,0 ml.

Indicaciones: Para el tratamiento y control de *Fasciola hepatica* (etapas inmaduras a partir de la 8ª semana y adultos); Nematodos gastrointestinales: *Haemonchus* spp., *Bunostomum* spp., *Oesophagostomum* spp.

Período de carencia:

No enviar a faena animales cuya carne se destine a consumo humano hasta transcurridos 30 días del último tratamiento.

Contraindicaciones:

No se recomienda su uso en hembras en lactación.

Presentación: 250 ml, 500 ml.



Especies animales a las que se destina:
Bovinos.

Vía de administración:
Inyectable subcutánea.

No administrar más de 10 ml por punto de inoculación.

Dosis:

1 ml cada 25 kg de peso vivo, (equivalente a 3 mg / kg de p.v. de Rafoxanida).

ANTIPARASITARIOS

INYECTABLES

ENDECTO PLUS



Composición: Cada 100 ml contiene:

Doramectina 0,5 g.

Levamisol HCl 15,0 g.

Excipientes c.s.p. 100,0 ml.

Indicaciones: Está indicado para el tratamiento y control de parásitos externos e internos en bovinos, a partir de los 3 meses de edad.

Propiedades:

Nemátodos gastrointestinales

(adultos y larvas en cuarto estadio).

Haemonchus sp. *Trichostrongylus* sp. *Cooperia* sp.*

*Bunostomum phlebotomum** *Strongyloides papillosus**

Oesophagostomum sp. *Trichuris* spp*

*Actúa solo estado adulto

Nemátodos pulmonares

(adultos y larvas de cuarto estadio).

Dictyocaulus viviparus.

Ácaros

Productores de sarna.

Psoroptes spp.

Sarcoptes spp.

Piojos chupadores

Haematopinus spp. *Linognathus* spp. *Solenopotes* spp.

Larvas cutáneas

Responsables de miasis e infestaciones.

Cochliomyia hominivorax. *Dermatobia hominis*.

Período de carencia:

Carne: 27 días.

Leche: No administrar en vacas en producción de leche para consumo humano.

Contraindicaciones:

No debe utilizarse en toros de carne destinados a la reproducción de más de 1 año de edad, terneros lecheros y terneros de carne.

Presentación: 250 ml y 500 ml.



Especies animales a las que se destina:
Bovinos.

Vía de administración:
Vía subcutánea en la tabla del cuello.

Dosis:

Aplicar como dosis única, 1 ml por cada 25 kg de peso vivo, equivalente a 0,2 mg de Doramectina / kg y 6 mg de Levamisol / kg.

No aplicar más de 10 ml en un mismo punto de inyección.



ANTIPARASITARIOS

ORALES

TRICLACHERRY PLUS
FENZOLE 10% ORAL
SIPCAR PLUS Pasta Oral
EQUIMAX T

ANTIPARASITARIOS

ORALES

TRICLACHERRY PLUS

PODEROSO
FASCIOLICIDA



Composición: Cada 100 ml contiene:

Triclabendazole	10 g.
Fenbendazole	10 g.
Excipientes c.s.p.	100 ml.

Indicaciones: Combinación formulada para el control de infecciones de *Fasciola hepatica* y *Fasciola gigantica* en sus fases adultas e inmaduras de menos de una semana de edad, y para el tratamiento y control de parásitos internos (nematodos gastrointestinales y pulmonares).

Período de carencia:

Carne: 28 días.

Leche: No administrar en animales en etapas de producción lechera cuya leche se destine a consumo humano.

Presentación: 1 Litro.



Especies animales a las que se destina:
Bovinos y Ovinos.

Vía de administración:
Oral.

Dosis:

Ovinos:

1ml cada 10 kg de peso vivo, equivalente a 10 mg de Fenbendazole y 10 mg de Triclabendazole / kg p.v.

Bovinos:

6 ml cada 50 kg de peso, equivalente a 12 mg de Triclabendazole y Fenbendazole / kg p.v.

ANTIPARASITARIOS

ORALES

FENZOLE 10% ORAL



Composición: Cada 100 ml contiene:

Fenbendazole 10,0 g.
Excipientes c.s.p. 100 ml.

Indicaciones: Antiparasitario interno de amplio espectro, adulticida, larvicida y ovicida.

Indicado para el tratamiento y la prevención de Nematodes gastrointestinales y pulmonares.

Período de carencia:

No enviar a faena animales cuya carne se destine para consumo humano antes de transcurridos 14 días del último tratamiento.

No remitir leche para consumo hasta transcurridos 3 días del último tratamiento.

Contraindicaciones:

Evitar inhalar, aplicar preferentemente con viento a favor.

Se aconseja el uso de guantes para su aplicación.

Lavarse las manos con agua y jabón luego de manipular el producto.

No comer, beber ni fumar mientras se manipula.

Presentación: 100 ml, 1Litro.



Especies animales a las que se destina:
Bovinos, Ovinos y Equinos.

Vía de administración:
Oral o Intrarruminal.

Dosis:

Ruminantes:

- 5 mg/kg p.v.
(1 ml cada 20 kg p.v. animal);
en Ostertagiasis tipo II
(larvas inhibidas).
- 10 mg/kg p.v.
(1 ml cada 10 kg p.v. animal).

Equinos:

- 7,5 mg/kg p.v.
(1,5 ml cada 20 kg p.v. animal).

Puede ser utilizado en hembras gestantes en cualquier etapa de la gestación.

ANTIPARASITARIOS

ORALES

SIPCAR PLUS Pasta Oral

**Composición:** Cada 100 g contiene:

Ivermectina 0,4 g.
Pamoato de Pirantel 38,3 g.
Excipientes c.s.p.

Indicaciones: Nematodocida oral en pasta.
Para el control y tratamiento de las parasitosis internas de los equinos, a base de Pamoato de Pirantel. Suficiente para 500 kg de peso vivo.

Contraindicaciones:

Ajustar la dosis de acuerdo al peso del animal.

Se recomienda no administrar en caso de animales muy debilitados.

No administrar conjuntamente con organofosforados o dietilcarbamazina.

Presentación: Caja con Jeringas Plásticas de 25 g.



Especies animales a las que se destina:
Equinos.

Vía de administración:

Oral con la ayuda de la jeringa dosificadora en la que viene presentado el producto.

Dosis:

Administrar 5 g por cada 100 kg de peso.

ANTIPARASITARIOS

ORALES

EQUIMAX T



Composición: Cada gramo contiene:

Doramectina 10 mg.

Praziquantel 150 mg.

Excipientes c.s.p.

Indicaciones: Antiparasitario oral para equinos de amplio espectro, a base de Doramectina y Praziquantel. Suficiente para 600 kg de peso vivo.

Presentación: Caja con Jeringas Plásticas de 12 g.



Especies animales a las que se destina:
Equinos.

Vía de administración:
Vía oral con ayuda de la jeringa dosificadora.

Dosis:
Administrar acorde al peso del animal a una dosis de 0,2 mg de Doramectina / kg de peso vivo y 3 mg de Praziquantel / kg (2 g del producto c /100 kg de peso vivo).



ARETES

INSECTICIDAS

POWER FLY OUT

ARETES

INSECTICIDAS

POWER FLY OUT



Composición: Cada 100 g de Caravana contiene:

Diazinón 30,0 g.

Clorpirifos 10,0 g.

Agentes de formulación c.s..

Indicaciones: Antiparasitario externo. Mosquicida.
Para el control y eliminación de la mosca de los cuernos
(*Haematobia irritans*) en bovinos.

Indicado en presencia de cepas resistentes a piretroides y
piojos (*Bovicola bovis* y *Linognathus vituli*).

Ayuda en el control de moscas de la cara
(*Musca autumnalis*).

Forma de uso:

Colocar al inicio de la temporada de la mosca, se coloca
un Arete (Caravana) por animal con ayuda de una pinza
aplicadora.

El Arete se mantendrá en el animal por 20 semanas
(5 meses) al cabo de las cuales deberá ser retirado para
evitar el desarrollo de resistencia.

Presentación: 20 Caravanas.




**Especies animales
a las que se destina:**
Bovinos.

**Advertencias y
Precauciones:**

- Retirar los Aretes antes de enviar los animales a matadero.
- No aplicar a animales menores de tres (3) meses de edad.

**Precauciones para el
operador:**

- Usar tapabocas para evitar la inhalación.
- No poner en contacto con la piel.
- No comer ni fumar durante la aplicación.
- Usar guantes y ropa protectora.
- Lavar manos y piel expuestas con agua y jabón luego de su aplicación.

A close-up photograph of a cow's head, showing its brown and white fur, large eyes, and a pink nose. The cow is looking directly at the camera.

ECTOPARASITICIDAS

POUR ON

CHERRYON TAMBO
FIPROCHERRY POUR ON
MAXIMUS PLATINUM

ECTOPARASITICIDAS

POUR ON

CHERRYON TAMBO



Composición: Cada 100 ml contiene:

Cipermetrina high cis	6.0.
Butóxido de piperonilo	7.0 g.
Carbaril	2.0 g.
Excipientes c.s.p.	100 ml.

Indicaciones: Antiparasitario externo para el control y tratamiento de insectos: Moscas, *Haematobia irritans* (mosca de los cuernos), mosquitos, piojos chupadores (*Anoplura*, *Haematopinus*, *Linognathus*) y masticadores (*Mallophaga* y *Damalinia*).

Período de carencia:

Carne: 6 días.

Leche: 0 días.

Contraindicaciones:

No administrar simultáneamente con otros insecticidas.

No aplicar en animales cansados estresados, enfermos o que presenten lesiones de piel en la zona de aplicación.

Presentación: 1 Litro POUR ON.



Especies animales

a las que se destina:

Bovinos, Equinos y Porcinos.

Vía de administración:

POUR ON, aplicar por derrame sobre la zona dorsal del animal desde la cruz hasta la base de la cola.

Realizar su aplicación en áreas ventiladas.

Se recomienda no comer, beber ni fumar durante la misma y el uso de guantes protectores.

Dosis:

Bovinos:

Hasta 400 kg, 10 ml.

Más de 400 kg, 20 ml por animal.

Equinos:

20 ml.

Porcinos:

10 ml.

La dosis puede repetirse a los 30 días, periodo que puede variar según la carga de parásitos.

ECTOPARASITICIDAS

POUR ON

FIPROCHERRY POUR ON



Composición: Cada 100 ml contiene:

Fipronil 1.0 g.
Vehículo c.s.p. 100.0 ml.

Indicaciones: Garrapaticida, piojicida y mosquicida.

Para el tratamiento y control de:

La garrapata *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*,

Berne o ura (*Dermatobia hominis*),

Piojos (*Damalinia ovis*),

Mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*) y

la Miasis (*Cochliomyia hominivorax*) que infestan a los bovinos (destinados a la producción de carne).

Período de carencia:

Carne: No faenar animales para consumo humano hasta 100 días después de la última aplicación.

Leche: No administrar a hembras en producción lechera cuya leche se destine para consumo humano, ni en el último tercio de la gestación.

Contraindicaciones:

Es un antiparasitario externo para ser utilizado exclusivamente en bovinos.

Presentación: 1 Litro POUR ON.



Especies animales a las que se destina:
Bovinos.

Vía de administración:
Sobre el dorso del animal, desde la nuca hasta la última vértebra lumbar.

Dosis:

Aplicar 1 ml del producto por cada 10 kilos de peso vivo.

En caso de predios que quieran controlar la garrapata se deberá utilizar cada 35 días.

Esquema de Dosificación Sugerido:

Kg de Peso Vivo	Dosis / ml
50 - 200 kg	20 ml
200 - 300 kg	30 ml
300 - 400 kg	40 ml
400 - 500 kg	50 ml

ECTOPARASITICIDAS

POUR ON

MAXIMUS PLATINUM



Composición:

Fipronil	1,0 g.
Fluazurón	2,5 g.
Excipientes c.s.p.	100,0 ml.

Indicaciones: Antiparasitario externo POUR ON.
Por la combinación de sus principios activos se logra acción en todas las etapas del ciclo de la garrapata. Garrapaticida, mosquicida, bernicida y piojicida.

Vía de administración y dosificación:

MAXIMUS PLATINUM: es una solución de uso tópico para aplicación POUR ON.

Colocar sobre el dorso (lomo) del animal desde la cruz hasta la grupa, en dos líneas paralelas a la columna vertebral.

10 ml de **MAXIMUS PLATINUM** POUR ON,
cada 100 kg de peso animal
(equivalente a 1,0 mg de Fipronil y
2,5 mg de Fluazurón / kg. p.v.).

En casos de terneros al pie de la madre no dosificar ya que están protegidos a través de la leche materna.

Para su aplicación se recomienda usar guantes y ropa apropiada a fin de evitar el contacto del producto con piel y mucosas del operario.

De usar el dosificador o aplicador para su administración, es recomendable enjuagarlo después de su uso con el fin de prolongar su vida útil.

Presentación: 1 Litro POUR ON.



Especies animales a las que se destina:
Bovinos.

Período de carencia:

Carne: 100 días.
No aplicar en hembras lecheras en producción destinada a consumo humano o 3 meses antes del parto.

Precaución:

No aplicar en animales mojados.
Si llueve durante tres horas luego de la aplicación, la eficacia del producto puede disminuir.



ECTOPARASITICIDA

BAÑO POR ASPERSIÓN

TICKGARD PLUS

ECTOPARASITICIDA

BAÑO POR ASPERSIÓN

TICKGARD PLUS

CLORFENVINFOS + ALFA-CIPERMETRINA

GARRAPATICIDA • SARNICIDA • MOSQUICIDA



Composición:

Cada 100 ml contiene:
Clorfenvinfos 30,0 g.
Alfa-Cipermetrina 3,0 g.
Excipientes c.s.p. 100 ml.

Indicaciones:

BAÑO DE INMERSIÓN O ASPERSIÓN (mecánica o manual) de bovinos, ovinos y caprinos. Controla *Psorergates ovis*, garrapatas, sarna ovina, piojos y protege de ataques de *Lucilia* spp. en ovejas y cabras. Controla garrapatas, piojos y protege contra dípteros molestos (moscas chupadoras y carroñeras) y miasis en bovinos.

Dosis:

- **Pre-mezcla:** Una parte del concentrado en dos partes de agua (resultará en una emulsión blanca). Colocar la misma en el dispensador con el volumen de agua restante y revolver hasta completa dispersión. En ovinos y caprinos se recomienda baño de inmersión en vez del de aspersión.
- **Pie de baño:** 1 litro del producto por cada 1000 litros de agua.
- **Reposición:** 1 litro de producto por cada 600 litros de agua, cuando 1/3 del volumen del baño haya sido removido del tanque. Para prevenir claudicaciones post baño adicionar Sulfato de Zinc al baño 1 kg por cada 1000 L de agua. Para controlar la dermatofilosis en ovejas, 1 kg de Sulfato de Zinc por cada 400 L de baño.
- **Aplicación tópica (*Lucilia* spp.):** 1 L del concentrado / 500 L de agua o 20 ml / 10 L de agua. Revolver bien. Aplicar en zonas afectadas y en el lomo del animal luego de lluvias. La lana contra la piel debe de quedar bien húmeda.

Bovinos:

Baños de INMERSIÓN: Carga: 1 L de producto en 1000 L de agua. Recarga, 1 L de producto en 600 L de agua.

Baños de ASPERSIÓN Mecánicos: La misma cantidad que para baño de inmersión. Apróx. 3 L por animal + el volumen del producto que queda en el sistema de bombeo.

Baños de ASPERSIÓN Manual: 1 L / 1000 L de agua o 10 ml / 10 litros de agua. 5 -10 L por animal.



Especies animales

a las que se destina:

Bovinos, Ovinos y Caprinos.

Período de carencia:

Carne: 7 días.

Leche: 6 horas.

Vía de administración:

Baño de INMERSIÓN O ASPERSIÓN (mecánica o manual).

Intervalos entre baños:

Garrapatas: Baño semanal hasta que esté libre de larvas o garrapatas. Después cada 2 semanas excepto en casos de infestaciones severas con garrapata marrón de orejas, deseable el baño semanal. Se recomienda baños cada 2 semanas todo el año (incluso en invierno).

Piojos: Una aplicación es suficiente.

Para el control de moscas:

BAÑOS DE INMERSIÓN O ASPERSIÓN semanales por un periodo de 3 semanas pueden ser aplicados. Se puede repetir el procedimiento si es necesario.


Presentación: 100 ml, 1 Litro.



MATAGUSANOS

CURABICHERRY PLATA
CURABICHERRY VIOLETA
CURABICHERRY POMADA

CURABICHERY PLATA



Composición: Cada 100 ml contiene:

DDVP (vapona)	1,60 g.
Cipermetrina	0,37 g.
Sulfadiazina	0,11 g.
Butóxido de piperonilo	0,021 g.
Aluminio en polvo	4,725 g.
Excipientes c.s.p.	100 ml.
Propelente (Butano).	

Indicaciones: Prevención y control de miasis, en cualquier tipo de heridas inclusive aquellas ocasionadas por castración, descole, descorne, marcación, actos quirúrgicos, ombligo del recién nacido y otras.

Por las características de la formulación, que permite un volteo importante de parásitos y larvas y una actividad residual prolongada evitando la contaminación, **CURABICHERY PLATA** colabora con los tiempos de reparación tisular, acelerando la cicatrización.

Período de carencia:

Carne: 6 días.

Contraindicaciones:

No usar en felinos.

Producto tóxico para abejas, peces y pájaros.

Presentación: Spray 440 ml.



**Especies animales
a las que se destina:**

Bovinos, Ovinos, Caprinos,
Equinos, Porcinos y Caninos.

**Vía de administración
y dosificación:**

Cubrir la zona afectada aplicando **CURABICHERY PLATA** a una distancia de 15 a 20 cm de la herida.

Reiterar la aplicación cada vez que se crea necesario.

CURABICHERRY VIOLETA



Composición: Cada 100 ml de concentrado contiene:

Clorpirifos	1,315 g.
DDVP.	2,130 g.
Violeta de Genciana	0,315 g.
Alcohol Isopropílico	9,26 g.
Xilol c.s.p.	100 ml.

Cada aerosol contiene:

Concentrado	238 ml.
Propelente c.s.p. (un aerosol)	

Indicaciones: Prevención y control de miiasis (bichera, gusanera), en cualquier tipo de heridas, inclusive aquellas ocasionadas por castración, descole, descorne, herraje, actos quirúrgicos, ombligo del recién nacido y otras.

Por las características de la formulación, que permite un volteo importante de parásitos y larvas y una actividad residual prolongada evitando la contaminación, **CURABICHERRY VIOLETA** colabora con los tiempos de reparación tisular, acelerando la cicatrización.

Período de carencia:

Carne: 6 días.

Contraindicaciones:

Nunca administrar por vía oral.
Manipular con precaución.
Evitar el contacto directo con piel y mucosas.
No usar en felinos.
Producto tóxico para abejas, peces y pájaros.

Conservación:

Conservar el producto en local seco y fresco, al abrigo de la luz solar.
No exponer a temperaturas superiores a 40 °C.

Presentación: Spray 440 ml.



Especies animales a las que se destina:

Bovinos, Ovinos, Equinos, Porcinos y Caninos.

Vía de administración y dosificación:

AGITAR ANTES DE USAR.
Cubrir la zona afectada aplicando **CURABICHERRY VIOLETA** a una distancia de 15 a 20 cm de la herida.

Reiterar la aplicación cada vez que se crea necesario.

Advertencia:

Puede ser fatal en caso de ser ingerido. No induzca el vómito. En caso de ingestión accidental, acudir al Médico Veterinario con el envase.

Antídoto: Sulfato de Atropina.

Categoría Toxicológica: (Dos)
Evitar excesivas pulverizaciones en ambientes cerrados.
No inhalar, fumar, comer ni beber durante el uso, luego de ello lavarse bien las manos.
No guardar o almacenar junto con alimentos.
No reutilizar, perforar o tirar al fuego los envases vacíos.
Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Descartar envases en el centro de acopio más cercano.

CURABICHERRY POMADA



Composición:

Cipermetrina	2.0 g.
Diclorvos	1.0 g.
Excipientes c.s.p.	100,0 g.

Indicaciones: Antiparasitario externo, repelente.
Profilaxis y tratamiento de miasis cutánea.
Repelente de insectos. Larvas de la bichera. Moscas.

Como preventivo en todo tipo de heridas, ombligo de los recién nacidos, castraciones, descornes, cirugías en general.

Período de carencia:

Carne: 15 días.

Leche: 72 horas.

Contraindicaciones:

No usar en felinos.

Presentación: 500 g.



Especies animales a las que se destina:

Bovinos, Ovinos, Equinos,
Porcinos y Caninos.

Vía de administración:

Uso tópico.

Dosis:

Por tratarse de un producto de uso tópico, no existe una dosificación específica, dependiendo del tamaño de la herida y/o bichera y de la cantidad de larvas, se recomienda cubrir bien la zona afectada a tratar y los alrededores de la misma.

Como preventivo, colocar en los bordes y alrededor de la herida.

Aplicar dos veces al día o acorde al criterio del médico veterinario tratante, hasta la remisión de la misma o acorde al criterio del Profesional actuante.

Aplicado acorde a indicaciones y frecuencia sugerida, posee un amplio margen de seguridad.



SUPLEMENTOS Y RECONSTITUYENTES


INYECTABLES

FORTEMAX SUERO
GANEKILOS B12
GANEMAX ATP

SUPLEMENTOS Y RECONSTITUYENTES

INYECTABLES

FORTEMAX SUERO



Composición: Cada frasco de 500 ml contiene:

Clorhidrato de Tiamina (Vit. B1)	10 mg.
Riboflavina 5-Fosfato (Vit. B2)	20 mg.
Clorhidrato de Piridoxina (Vit. B6)	15 mg.
Nicotinamida	1.000 mg.
Acetilmetionina	600 mg.
Cloruro de Colina	1.000 mg.
Cloruro de Sodio	3.500 mg.
Cloruro de Potasio	250 mg.
Cloruro de Calcio 2 H ₂ O	150 mg.
Cloruro de Magnesio 6 H ₂ O	90 mg.
Cloruro de Benalconio	50 mg.
Dextrosa	50 g.
Hidróxido de Sodio	0.6 g.
Agua Destilada, c.s.p.	500 ml.

Indicaciones: Es indicado para el tratamiento de agotamiento físico por exceso de trabajo o de producción.

Anorexias, caquexias y deshidrataciones.

Se usa como adyuvante en el tratamiento de las helmintiasis y de las enfermedades infecciosas, como anaplasmosis y piroplasmosis.

Después de intervenciones quirúrgicas, hemorragias prolongadas, neuropatías y cetosis.

Dosis:

Clase	Peso	Dosis
Bovinos y Equinos adultos	400 a 800 kg	1 a 2 L
Bovinos y Equinos jóvenes Ovinos y Cerdos adultos	200 a 400 kg	500 ml
Ovinos y Cerdos jóvenes	50 a 200 kg	20 ml a 100 ml



Especies animales a las que se destina:

Bovinos, Ovinos,
Equinos y Porcinos.

Vía de administración:

Vía intravenosa, usando el equipo apropiado para la aplicación de suero.

También podrá ser aplicado por las vías subcutánea o intraperitoneal.

La ampolla de Vitamina B12 debe ser añadida al frasco de suero, inmediatamente antes de su aplicación.

Presentación:

**Frasco de 500 ml
acompañado de una
Ampolla de 3ml
conteniendo 10.000 mcg
de Vitamina B12 con
Equipo para aplicación.**

SUPLEMENTOS Y RECONSTITUYENTES

INYECTABLES

GANEKILOS B12

**Composición:** Cada 100 ml contiene:

Fosforilcolina Cloruro de Calcio	5,0 g.
Digerido enzimático de Caseína	5,0 g.
Selenito de Sodio	0,0022 g.
Cianocobalamina (Vitamina B12)	0,005 g.
Tiamina (Vitamina B1)	0,10 g.
Piridoxina (Vitamina B6)	0,06 g.
Excipientes c.s.p.	100 ml.

Indicaciones: Tónico reconstituyente, roborante (suplemento vitamínico, mineral y aminoácidos), estimulante del estado general.

Para el tratamiento y la prevención de enfermedades relacionadas con trastornos del metabolismo, debilidad, anorexia, recién nacidos, tetanias, problemas reproductivos.

Coadyuvante en el tratamiento del restablecimiento del estado general y en la convalecencia de las enfermedades infecciosas, parasitarias, anemias, destete precoz, estrés, agotamiento, indigestiones, decaimiento del estado general, desnutrición, reproductores en período de descanso, soporte de crecimiento, estimulante del apetito, entre otros.

Sus componentes promueven un ahorro de energía y el desarrollo de una flora normal para un óptimo aprovechamiento de los alimentos.

Presentación: Frascos de 100 ml y 500 ml.

**Especies animales
a las que se destina:**

Bovinos, Ovinos, Caprinos, Equinos, Porcinos, Caninos, Felinos y animales de peletería.

Vía de administración:

Parenteral, inyectable por vía subcutánea, intramuscular o intravenosa según la indicación para cada especie.

Dosificación:**Posología recomendada:**

Bovinos adultos: 10 a 25 ml.

Terneros: 5 a 15 ml, I.V. o S.C.

Equinos adultos: 15 a 20 ml.

Potrillos: 5 a 15 ml, S.C.

Ovinos y Caprinos

adultos: 3 a 5 ml.

Corderos y Cabritos: 2 a 3 ml, I.M o S.C.

Porcinos adultos: 5 a 10 ml.

Lechones: 3 a 5 ml, S.C.

Caninos: 0,5 a 5 ml, I.M. o S.C.

Felinos y animales

de peletería: 0,5 a 2,5 ml, I.M o S.C.

En animales sanos administrar la mitad de la dosis acorde a los requerimientos y exigencias de cada caso, indicados por el Profesional Actuante.

SUPLEMENTOS Y RECONSTITUYENTES

INYECTABLES

GANEMAX ATP



Composición:

Cada 100 ml contiene:	
Adenosín trifosfato (ATP)	0,652 mg.
Vitamina A palmitato	3.000.000 UI.
Vitamina D3	1.000.000 UI.
Vitamina E acetato (tocoferol)	1,000 g.
Edetato de sodio y hierro	0,434 g.
Seleniometionina	0,150 g.
Edetato de cobre	0,158 g.
Edetato de zinc y sodio	0,160 g.
Edetato de sodio y cobalto	0,103 g.
Cloruro de magnesio hexahidrato	0,236 g.
Yoduro de sodio	0,012 g.
Gluconato de calcio monohidrato	1,230 g.
Clorfeniramina maleato	2,000 g.
Excipientes c.s.p.	100 ml.

Indicaciones:

- Reconstituyente, energético anti fatigante, vigorizante.
- Preventivo en los pastoreos de gramilla fina, especial para destete, vacas lecheras y animales de finca en general.
- En estados de carencias en general.
- Coadyuvante en terapias de recuperación.
- Indicado como elevador de defensas en ovinos, en entrada de otoño o salida de invierno.
- Indicado en machos y hembras antes del servicio y antes del parto.
- Como aporte de energía para la reducción del estrés en el transporte y manejo de los animales.
- Indicado como complemento de la desparasitación y otros tratamientos como vacunaciones.
- Complemento en los tratamientos preventivos.

Presentaciones:

Frascos de 100 ml, 250 ml y 500 ml.



CONTIENE ATP

Especies animales a las que se destina:

Bovinos, Ovinos, Caprinos,
Porcinos y Equinos.

Vía de administración:

Suspensión inyectable por vía
intramuscular o subcutánea
según la indicación para
cada especie.

Dosificación:

Posología recomendada:

Bovinos: 2 ml por cada 100
kg de peso. Administrar vía
Intramuscular o Subcutánea.

Equinos: 2 ml por cada 100
kg de peso. Administrar vía
Intramuscular.

Ovinos, Caprinos y Porcinos:
1 ml por cada 15 kg de peso.
Administrar vía Intramuscular.

Se recomienda en una sola
aplicación de acuerdo al
estado de cada animal, con
repetición de la aplicación a
los 30 días.



SUPLEMENTO

ORAL

HEPATOCHERRY 1 LITRO

SUPLEMENTO

ORAL

HEPATOCHERRY

1 LITRO



Composición: Cada 100 ml contiene:

DL-metionina	8 g.
Colina Bitartrato	8 g.
Silimarina	0,600 g.

Indicaciones: Para animales en entrenamiento, con necesidad de mejora de su apariencia y comportamiento, convalecientes de cualquier enfermedad, anoréxicos, con hepatopatías agudas o crónicas, en los casos en los que se administra medicamentos que comprometan el parénquima hepático y su función, recuperación de cirugías, etc.

Posee factores antioxidantes, lipotrópicos y desintoxicantes.

Algunas características de sus componentes:

- **Metionina** es un aminoácido esencial, lipotrópico, que es además un antioxidante de gran alcance y una buena fuente de azufre para el organismo.
- **Colina** esencial para el hígado y el cerebro, molécula precursora de la acetilcolina, interviene en muchas funciones del organismo como la síntesis de componentes que forman parte de las membranas celulares así como en la utilización de las grasas y su transporte fuera del hígado, actúa como desintoxicante hepático.
- **Silimarina** es un potente antioxidante proveniente del cardo (*Silybum marianum*), absorbe los radicales libres que destruyen las células sanas del organismo.

Presentación: 1 Litro.



Especies animales a las que se destina:
Equinos.

Vía de administración:
Modo de Empleo: Vía oral.

Agitar muy bien antes de usar.

Dosis:
20 ml / día, según el objetivo de su administración.



MEDICINA ANIMAL DE CALIDAD

LABORATORIOS **Cherry**

DIVISIÓN VETERINARIA



Línea de Grandes Animales del



MARCAS de
CALIDAD



labcherryvzla

www.laboratorioscherryvenezuela.com